

Liste des projets retenus de la CAAP second semestre 2022

Nom du Porteur de projet	Promoteur	Etablissement du porteur de projet	Titre de l'étude
Dr Eric ABERGEL	Clinique St Augustin	Clinique St Augustin	SURveillance des patients porteurs d'un rétrécissement aortique serré asymptomatique par ECHOgraphies d'effort itératives.
Dr Maxime ANTONI	Clinique de l'Orangerie	Clinique de l'Orangerie	Unexpected Positive Cultures in Rotator cuff revision surgery: significance and influence on outcomes and tendon healing
Dr Stanislas BATAILLE	IPN	Clinique Bouchard	Rôle de la myostatine et de la toxine urémique indoxyl sulfate dans les complications cardiovasculaires des patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés
Dr Laurent BAVEREL	Clinique Breteche	Clinique Breteche	Réparation de la coiffe des rotateurs sous Anesthésie loco-Régionale isolée versus Anesthésie Générale combinée à une anesthésie loco-régionale : Essai randomisé contrôlé de supériorité
Dr Jeremy COGNAULT	Dr Jeremy COGNAULT	Clinique du Parc	Healing of the quadriceps tendon at 6 month after harvest for anterior cruciate ligament reconstruction measured by ultrasonography
Dr Hugues DEMEZON	Clinique Jean Villar	Clinique Jean Villar	Intérêt de l'acide Tranexamique IV péri opératoire dans la douleur post opératoire après chirurgie arthroscopique de l'épaule (Etude ASCOT – ArthroSCOpie acide Tranexamique)
Dr Julien DOMONT	WEPROM	Clinique Victor Hugo	Évaluation de la proportion de patients présentant une sarcopénie au diagnostic pour des patients atteints d'un cancer métastatique ou d'une hémopathie maligne non précédemment traités. SPACE 2
Dr David GALLINET	SOFEC	Clinique Saint-Vincent	Faut-il réparer le sous-scapulaire lors de la mise en place d'une prothèse inversée d'épaule par voie delto-pectorale ?
Dr Philippe GIAIME	IPN	Clinique Bouchard	Etude rétrospective de comparaison de l'impact des horaires de dialyse chez les patients en insuffisance rénale chronique terminale traités par hémodialyse le matin versus l'après-midi-Etude SOMMAP
Dr Philippe GIAIME	IPN	Clinique Bouchard	Dialyse Matinale et Troubles du Sommeil : Impact de l'horaire de dialyse sur la qualité du sommeil, et conséquences sur la Morbi-Mortalité , des patients en insuffisance rénale chronique terminale traités par hémodialyse : DIATSOMM
Dr Jean Marc GLASSON	Dr Glasson	Clinique St François	Mesure de la latéralisation des prothèses d'épaule sur la base d'un point fixe « Y » glénoïdien validé

Dr Ismael HAMADOU	Polyclinique Jean Villar	Polyclinique Jean Villar	Etude prospective monocentrique comparant la technique d'hystérectomie bénigne réalisée par voie coelioscopique, coelioscopique robot-assistée ou v-notes.
Dr Pierre Charles HENRY	Clinique Saint Vincent	Clinique Saint Vincent	AQUENDOPROST : Etude de la valeur ajoutée de l'utilisation de la technique AQUabeam dans le traitement ENDOScopique de l'hypertrophie bénigne de PROSTate obstructive pour la préservation de l'éjaculation antégrade post opératoire
Dr Michael KASSAB	Polyclinique de Poitiers	Polyclinique de Poitiers	Efficacité de l'utilisation du système STENDO® sur l'induction de la vasculogénèse permettant un raccourcissement du délai de cicatrisation des plaies chroniques d'origine vasculaire des membres inférieurs - CICART - STENDO®
Dr Malo LEHANNEUR	Clinique Bouchard	Clinique Bouchard	Évaluation d'un modèle de détection automatisée pour définir l'absence ou la présence d'une lésion osseuse de glène à l'épaule. Corrélation d'un modèle de détection automatisée, à la détection humaine.
Dr Françoise LEVITTA	Clinique St François	Clinique St François	Etude prospective, monocentrique, randomisée, en ouvert, visant à évaluer l'apport d'un Suivi par Télémedecine, en complément du suivi standard, en Renforcement d'un parcours Obésité en Berry
Dr Martial MATINGOU	Clinique Esquirol	Clinique Esquirol	Apport de l'IA sur la prise en charge aux urgences des patients avec suspicion de fracture osseuse versus une prise en charge traditionnelle sur le taux de réadmission.
Dr Vincent MARTINEL	Clinique de l'Ormeau	Clinique de l'Ormeau	La ténotomie combinée du petit pectoral améliore les délais de récupération fonctionnelle et diminue les douleurs après prothèse totale inversée d'épaule.
Dr Martin MICHAUD	Clinique Ambroise Paré	Clinique Ambroise Paré	Stimulation électrique transcutanée du nerf vague au cours des manifestations douloureuses de la maladie de Fabry (SEVDOUFAB)
Dr Keyvan MOSTOFI	Centre Clinical	Centre Clinical	Etude monocentrique pour évaluation des avantages de la voie endoscopique per-cutanée en comparaison à la microdissectomie pour le traitement des hernies discales canalaires lombo sacrées ayant résisté aux traitements médicaux.
Dr Jean Paul NGUYEN	Clinique Breteche	Clinique Breteche	Utilisation des stimulateurs médullaires rechargeables dans le traitement des douleurs neuropathiques. Protocole d'évaluation par méthode quantitative et qualitative.
Dr Jérôme SAMPOL	IPN	Clinique Bouchard	La collaboration néphrologue/IPA impacte-t-elle positivement la progressivité de la maladie rénale chez le patient chronique de stade IV/V ?

Dr Othman SANDALI	GCS	Guillaume de Varye	Effect of minimizing light exposure intensity of 3D digital visualization (NGenuity) on macular function after cataract surgery in patients with early AMD: A comparative ERG
Dr Guillaume SERET	Association ECHO-Dialyse	Pôle Santé Sud	Etude rétrospective évaluant l'apport de la Rhéophérèse dans le traitement de la Calciphylaxie Urémique : « RHEO-CUA »
Dr Fabrice THOIN	Clinique Bouchard	Clinique Bouchard	ENDOSAS
Dr Sylvain VALLIER	Dr Sylvain VALLIER	Clinique Belledone	Évaluation de la consommation de gaz anesthésiques au bloc opératoire, étude avant après, étude de l'impact d'une campagne de formation et sensibilisation aux bonnes pratiques
Dr Nicolas VERDIER	Dr Nicolas VERDIER	Clinique Jean Villar	Is the LCEA a prognostic factor for clinical outcomes and conversion to THA following preservative surgery (arthroscopy, periacetabular osteotomy (Bernese), Shelf acetabuloplasty...) in patients with painful hips with borderline dysplasia