



### **TEP au 18F-FDG**

#### **ATTENTION :**

**Les résultats de la TEP peuvent être faussés chez les patients diabétiques et l'examen peut être annulé au dernier moment si certaines conditions ne sont pas remplies :**

- Le taux de sucre au moment de l'examen doit être entre 0,70 et 1,80 g/L.
- La dernière prise alimentaire doit remonter à plus de 6 heures.
- Il est conseillé de ne pas faire de repas riche ou tardif le soir précédent l'examen.
- Pour garantir la réalisation de votre examen dans les meilleures conditions, prenez Rendez-Vous de préférence en début de matinée.

#### **Vous avez un lecteur de glycémie ? :**

- Contrôlez votre glycémie au réveil dès la prise de RDV et les deux jours précédant l'examen pour vérifier que vous êtes entre 0,70 et 1,80 g/L.

Si votre glycémie est toujours supérieure à 1,80 g/L, contactez votre Médecin Traitant ou bien votre Diabétologue.

- Si votre glycémie est supérieure à 1,80 g/L le matin de l'examen : contactez-nous au 03 68 41 92 65 (Service de Médecine Nucléaire) avant de vous déplacer.

#### **Vous avez un traitement par pompe à insuline :**

- Être à jeun
- Gardez la pompe pour venir à l'examen avec votre débit basal.
- Tout bolus dans les 4 heures précédant l'examen conduira à l'annulation ou au report de l'examen.

**Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le Secrétariat au 03 68 41 92 65 ou par mail à : [secretariat-sim.ora@elsan.care](mailto:secretariat-sim.ora@elsan.care)**

<b>CONDUITE A TENIR</b>
-------------------------

TRAITEMENT	LA VEILLE DE L'EXAMEN	LE JOUR DE VOTRE RDV
<p><b>TRAITEMENT PAR METFORMINE :</b></p> <p>EUCREAS GLUCOPHAGE JANUMET KOMBOGLYZE METFORMINE STAGID VELMETIA</p>	<p>Prendre votre traitement normalement</p>	<p>Prendre votre traitement normalement</p>
<p><b>AUTRES ANTIDIABETIQUES ORAUX :</b></p> <p>AMAREL BYDUREON, DAONIL DIAMICRON FORXIGA GALVUS GLICAZIDE GLIMEPIRIDE GLUCOR JANUVIA JARDIANCE, OZEMPIC NOVONORM, REPAGLINIDE TRULICITY VICTOZA XELEVIA</p>	<p>Prendre votre traitement normalement</p>	<p>Ne pas prendre votre traitement avant l'examen</p> <p>Votre traitement pourra être pris après la réalisation de l'examen</p>
<p><b>TRAITEMENT PAR INSULINE LENTE :</b></p> <p>ABASAGLAR LANTUS LEVEMIR TOUJEO TRESIBA XULTOPHY</p>	<p>Faire les injections normalement comme d'habitude</p>	<p>Ne pas faire votre injection, elle pourra être faite après la réalisation de l'examen</p>
<p><b>TRAITEMENT PAR INSULINE RAPIDE :</b></p> <p>APIDRA FIASP HUMALOG NOVORAPID</p>	<p>Faites votre injection normalement la veille au soir de l'examen.</p> <p>Contrôlez votre glycémie au coucher, faites une injection si vous pensez que votre taux est trop haut.</p>	<p>Si possible, contrôlez votre glycémie 4 à 6 h avant l'examen et faites une dernière injection en cas de glycémie supérieure à 2 g/L.</p> <p>Si votre glycémie au réveil est supérieure à 1,80 g/L le jour de l'examen : contactez-nous au 03 68 41 92 65 (Service de Médecine Nucléaire) avant de vous déplacer.</p> <p>Si votre glycémie au réveil est inférieure à 1,80 g/L le jour de l'examen : venez à jeun sans faire votre insuline rapide habituelle du petit-déjeuner.</p> <p>Toute injection d'insuline rapide (ou bolus) dans les 4 heures précédant l'examen conduira à l'annulation ou au report de l'examen.</p>